

さとうきび向け除草剤

カーメックス® 顆粒水和剤

カーメックス®はイスラエル国アダマ・アグリカルチュラル・ソリューション・グループの登録商標です。

有効成分:DCMU 80.0%

さとうきび栽培の効率的な 雑草管理をご提案いたします。



- 作業軽減で低コストの実現
- 中耕培土までの期間が延び
茎数が増え、
増収につながります

水和剤から「顆粒水和剤」に剤型変更!!

★計量しやすくなりました!

★粉立ちが大幅に改善されました!

より使い
やすく
なりました!!



植付け後の カーメックス顆粒水和剤と 平均培土による単収向上の提案

植え付け

+

植付け1週間以内に
カーメックス顆粒水和剤

植付け後2ヵ月以上

平均培土時期




分けつ莖に土が
かぶらない様に

増収へ繋がる

夏植え栽培において、培土時期が 莖数に及ぼす影響

(平成21年12月さとうきび暦(宮古地区)より引用)



平均培土が15日違うだけで、
莖数に2000本/10a以上の差がある

登録内容(関連項目のみ一部抜粋)

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | DCMUを含む農 薬の総使用回数 |
|---------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------|
| | | | 薬 量 | 希釈水量 | | | |
| さとうきび (春植 又は 夏植) | 一年生雑草 | 植付覆土後 (雑草発生前) | 100~150g /10a | 100 l /10a | 1回 | 全面土壌 散布 | 2回以内 (土壌散布は 1回以内) |
| | 一年生及び 多年生 広葉雑草 | 雑草生育期 (草丈15cm以下) ただし収穫90日前まで | | | 2回以内 | 雑草莖葉 散布 | |
| さとうきび (株出) | 一年生雑草 | 萌芽前 (雑草発生前) | | | 1回 | 全面土壌 散布 | |
| | 一年生及び 多年生 広葉雑草 | 雑草生育期 (草丈15cm以下) ただし収穫90日前まで | | | 2回以内 | 雑草莖葉 散布 | |

使用上の注意

- 散布液調製後は、そのまま放置せず、出来るだけ速やかに散布してください。
- さとうきびに使用する場合、雑草莖葉散布の場合は、雑草の草丈が15cm以下の時期に散布してください。気温の高い時期(20℃)の散布が効果的です。
- 水源池、養魚池等に飛散流入しないよう十分注意してください。
- 砂質で水はけのよい圃場や激しい降雨の予想される場合は、薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受ける事をおすすめします。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所には置かないでください。

お求めは…

販売元



琉球産経株式会社

沖縄県豊見城市高安586番地
TEL 098-850-7791 FAX 098-856-1856