

カタツムリ類・ナメクジ類防除剤



ナメクジ類



ウスカワマイマイ



アフリカマイマイ

特長

サンケイマイマイペレットはカタツムリ類、ナメクジ類、アフリカマイマイなどを誘引し、食毒作用によって高い防除効果を発揮します。

カタツムリ類・ナメクジ類・誘殺剤

サンケイ
マイマイペレット[®]

農林水産省登録第12246号

〔有効成分〕メタアルデヒド 3.5%

〔性状〕赤褐色粒状

〔毒性〕普通物

〔有効年月〕3年

〔包装〕500g×30, 2kg×10

■適用害虫と使用方法

作物名	適用病虫害名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタアルデヒドを含む農薬の総使用回数
キャベツ	カタツムリ類	2.5kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	株元散布	6回以内 (散布及び株元散布は合計3回以内 (但し、株元散布は2回以内))
	アフリカマイマイ	1~2.5kg/10a				
レタス	アフリカマイマイ	1~2.5kg/10a				
みかん	カタツムリ類	2.5kg/10a	収穫30日前まで	6回以内	株元散布	6回以内
	アフリカマイマイ					
花き類・観葉植物	アフリカマイマイ カタツムリ類 ナメクジ類	1~4kg/10a	—	6回以内	株元散布	6回以内
たばこ	ウスカワマイマイ	4kg/10a	移植後	2回以内	株元散布	2回以内

作物名	適用場所	適用病虫害名	使用量	本剤の使用回数	使用方法	メタアルデヒドを含む農薬の総使用回数
ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイが加害する農作物等	ほ場周辺雑草地の生息地	アフリカマイマイ カタツムリ類 ナメクジ類	1~4kg/10a (1㎡当り1~4g)	6回以内	作物にかからないように土壌表面散布する。	6回以内

■注意事項

- (1) 作物体にかからないように土壌面、あるいは床面に処理してください。
- (2) 使用量は発生量に応じて所定薬量内で増減してください。
- (3) 雨や水が直接かかると効果が減少するので圃場では雨が予想される時の処理はさけ、温室では処理後2~3日は灌水がかからないようにしてください。
- (4) なるべく日中乾燥時の使用はさけ、夕刻時に使用してください。
- (5) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に、初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- (6) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

■安全使用上の注意

- 通常の使用方法では毒性は低いが、誤食などのないよう注意してください。
- 本剤の粉末が目に入らないように注意し、使用後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするようにしてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 家畜、家禽の飼料に混入しないように注意し、また処理後の本剤を家畜、家禽が食べないように注意してください。
- 使用後、残った薬剤はしっかりと封をして必ず安全な場所に保管してください。
- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が多量に食べると死亡する恐れがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないでください。

●ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない



製造
琉球産経株式会社

沖縄県豊見城市字高安586
〒901-0242 ☎(098) 850-7791(代)