

◆適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタアルテヒト [®] を含む農薬の総使用回数
ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイが加害する農作物等	ほ場周辺 雑草地の 生息地	アフリカマイマイ カタツムリ類 ナメクジ類	1~4 kg /10a (1m ² 当り 1~4g)	—	6回以内	作物にかからないように 土壌表面 散布する。	6回以内
たばこ	—	ウスカリマイマイ	4kg/10a	移植後	2回以内	株元散布	2回以内

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタアルテヒト [®] を含む農薬の総使用回数
キャベツ	カタツムリ類	2.5kg/10a	収穫14日前 まで	2回以内	株元 散布	6回以内 (散布及び株元 散布は合計3回 以内(但し、株 元散布は2回以 内))
	アフリカマイマイ	1~2.5kg/10a				
レタス	カタツムリ類	1~2.5kg/10a				
	アフリカマイマイ					
みかん	カタツムリ類	2.5kg/10a	収穫30日前 まで			
	アフリカマイマイ					
花き類・ 観葉植物	アフリカマイマイ カタツムリ類 ナメクジ類	1~4kg /10a	—	6回以内		6回以内

◆効果・薬害などの注意事項

- (1) 作物体にかからないように土壌面、あるいは床面に処理すること。
- (2) 使用量は発生量に応じて所定薬量内で増減すること。
- (3) 雨や水が直接かかると効果が減少するので圃場では雨が予想される時の処理はさけ、温室では処理後2~3日は灌水がかからないようにすること。
- (4) なるべく日中乾燥時の使用はさけ、夕刻時使用すること。
- (5) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に、初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (6) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意事項

- (1) 通常の使用方法では毒性は低いですが、誤食などのないよう注意すること。
- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3) 本剤の粉末が眼に入らないように注意し、使用後は手を石けんでよく洗うこと。
- (4) 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が多量に食べると死亡する恐れがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないこと。