

◆適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用場所	適用害獣名	本剤の使用回数	使用方法	クロファシリンを含む農薬の総使用回数
野ソが加害する農作物等	農地 山林	野ソ	—	本剤約10粒を紙包みとし、ソ穴に投入する。使用量は通常10アール当り、本剤250～500gとなる。毒餌施用後は、喫食箇所に対して、3～5日間連続配置する。	—

◆効果・薬害などの注意事項

- (1) 作業中は手袋などをして、直接毒餌が手（皮膚）にふれないように注意し、作業後は顔、手足など皮膚の露出部を石けんでよく洗うこと。
- (2) 犬、ねこ、牛、馬など家畜に毒餌を食われるおそれのある場所での使用はさけること。
- (3) 毒餌は誤食などのないように子供の手のとどかないところに置き、余った毒餌などは回収して適切に処理すること。
- (4) 本剤は1そ穴当り約10粒ずつ投入する。従って10アール当りの使用量は、野その生息数、そ穴数によって増減すること。

◆安全使用上の注意事項

通常の使用方法では毒性は低いですが、誤食などのないように注意すること。  
 万一、中毒を感じた場合、あるいは誤って飲み込んだ場合には、吐き出させ、安静にして直ちに医師の手当を受けること。出血症状にはビタミンK<sub>1</sub>を注射または内服させ、貧血が著しければ輸血したり、増血剤を与える。