

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数				
稲	ニカメイチュウ第1世代	1000～2000倍	60～150 L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散 布	3回以内 (種もみへの 処理は1回以 内、 育苗箱散布は 1回以内、 本田では2回 以内)				
	ニカメイチュウ第2世代 サンカメイチュウ第3世代	800～1000倍									
	ヒメヒゲムシ、カメムシ類 イネツトムシ、イネシガレンセンチュウ イネトオロイムシ、アブラムシ類	1000倍									
	イネハモクシバエ	1000～2000倍									
	イネヒメハモクシバエ	2500倍									
	フナヒゲコヤカ	2000～4000倍									
	イネシガレンセンチュウ	1000倍	—	は種前	1回	6～72時間浸漬 専用の種子消毒機を用いて乾燥種粒重量 の3%の量の希釈液を 種粒に吹付け処理又 は塗沫処理					
		100倍									
ニカメイチュウ、カメムシ類	300倍	25 L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布						
稲 (箱育苗)	イネシガレンセンチュウ	1000倍	育苗箱 (60×30×3cm、 使用土壌約5 L) 1 箱当り500ml	硬化期～ 移植前日	1回	育苗箱の上から均一 に散布する。					
麦類 (大麦、小麦 を除く)	アブラムシ類、アヲトウ ムキキモクシバエ	60～150 L/10a	収穫14日前まで	散布							
	アブラムシ類	800mL/10a		無人ヘリコプター による散布							
大麦	アブラムシ類、アヲトウ ムキキモクシバエ	1000倍	60～150 L/10a	収穫7日前まで		散布					
	アブラムシ類	800mL/10a	無人ヘリコプター による散布								
小麦	アブラムシ類、アヲトウ ムキキモクシバエ	250倍	25 L/10a			散布					
		1000倍	60～150 L/10a				無人ヘリコプター による散布				
	アブラムシ類	800mL/10a									
りんご		1000～2000倍	200～700 L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内				
	ナシヒメシキイ、モモシキイカ ハマキムシ類、ナシゲンハイ	1000倍									
	クワコナカイラムシ	1500倍									
	アメリカシロヒトリ	1000倍									
なし (有袋栽培)	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫14日前まで	6回以内			6回以内			
	シクイムシ類、ハマキムシ類 ナシゲンハイ、ナシホカ	1000倍									
	クワコナカイラムシ	1500倍									
	アメリカシロヒトリ	1000倍									
なし (無袋栽培)	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫21日前まで							
	シクイムシ類、ハマキムシ類 ナシゲンハイ、ナシホカ	1000倍									
	クワコナカイラムシ	1500倍									
	アメリカシロヒトリ	1000倍									

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	MEP を含む 農薬の総 使用回数	
かき	ハマキムシ類、カキノハタムシカ カキノカ、フジコナカイラムシ オオワタコナカイラムシ イカ類、アメリカシロヒトリ ミカ類若齢幼虫	1000倍	200～700 L/10a	収穫45日前まで	3回以内	散布	3回以内 (樹幹処理は 2回以内)	
もも	アブラムシ類、モモハモクシカ ナシヒメシクイ(心折防止)	1000～2000倍		収穫3日前まで	6回以内		6回以内 (樹幹処理 は1回以内)	
	ナシヒメシクイ、モモシクイカ ハマキムシ類、クワコナカイラムシ	1000倍						
	クワコナカイラムシ	1500倍						
みかん	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫14日前まで	5回以内	無人ヘリコプター による散布	5回以内 (樹幹処理は 1回以内)	
	ハマキムシ類 サンホーゼカイラムシ カネタキ、ミカンツボミタマハエ ケンキスイ類、コアオハナムグリ フラーハラソウムシ ミカンキシラムシ コナカイラムシ類	1000倍						
	ケンキスイ類、コアオハナムグリ アザミウマ類	10倍	5 L/10a					
なつみかん	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内 (樹幹処理は1 回以内)	
	ハマキムシ類 サンホーゼカイラムシ カネタキ、ミカンツボミタマハエ ケンキスイ類、コアオハナムグリ フラーハラソウムシ ミカンキシラムシ コナカイラムシ類	1000倍						
大粒種ぶどう	アブラムシ類、フクセンヒメコハ フトウスカシバ、フトウトリハ	1000～2000倍		収穫30日前まで	2回以内		4回以内 (収穫終了後 から萌芽まで は2回以内、 萌芽後は 2回以内)	
	ハマキムシ類、フトウトカミキリ キンケチフトソウムシ成虫	1000倍						
	クワコナカイラムシ	1500倍						
小粒種ぶどう	アブラムシ類、フクセンヒメコハ フトウスカシバ、フトウトリハ	1000～2000倍		収穫90日前まで	2回以内		2回以内 (樹幹処理及 び灌注処理は 合計1回以内)	
	ハマキムシ類、フトウトカミキリ キンケチフトソウムシ成虫	1000倍						
	クワコナカイラムシ	1500倍						
おうとう	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫21日前まで	3回以内		樹幹散布	3回以内
	ハマキムシ類、ナシクンバイ アメリカシロヒトリ	1000倍						
うめ	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫14日前まで	2回以内		散布	2回以内
	アメリカシロヒトリ、ハマキムシ類	1000倍						
オリーブ	オリーブアナアキゾウムシ	50倍	0.3～3 L/樹	収穫21日前まで	3回以内	樹幹散布	3回以内	
いちよう (種子)	コウモリカ、ヒメボクトウ	100倍		収穫60日前まで				
いちご (露地栽培)	アブラムシ類	2000倍	100～300 L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内	
ほうれんそう		1000～2000倍						
		ホウレンソウケナコナグニ	2000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	MEP を含む 農薬の総 使用回数
ね ぎ	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫 21 日前	2回以内	散布	2回以内
	アザミウマ類	700～1000倍		収穫 14 日前まで			
	ネギコガ	1000倍					
ごぼう	アブラムシ類、フキノメイガ	1000～2000倍		収穫 21 日前まで	5回以内		5回以内
たまねぎ	アブラムシ類	700～1000倍		収穫開始 14 日前まで			
	アザミウマ類						
トマト	アブラムシ類、オオニジュウヤホシテントウ	2000倍		収穫 3 日前まで	6回以内		6回以内
な す	アブラムシ類、テントウムシダマシ類	1000～2000倍		収穫前日まで			
きゅうり メロン しろうり	アブラムシ類	1000倍					
すいか	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫 14 日前まで	3回以内		3回以内
	アザミウマ類	700～1000倍					
かぼちゃ	アブラムシ類	1000～2000倍	800mL /10a	収穫 21 日前まで	無人ヘリコプターに よる散布		
	アザミウマ類	700～1000倍					
だいず	ダースヤクマハエ、シロイモシマダラムシ、 ダースヤムシ、カメシ類、ウコンノメイガ マシクイ	8倍		収穫 21 日前まで			
	シロイモシマダラムシ、 ダースヤクマハエ、カメシ類 マヒメヤムシ、ウコンノメイガ	1000倍					
えんどうまめ	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫30日前まで	4回以内	4回以内	
	マシクイ	1000～1500倍					
	シロイモシマダラムシ、 ダースヤクマハエ、カメシ類 マヒメヤムシ	1000倍					
	アブラムシ類	1000～2000倍					
豆類 (種実、ただし、だ いず、あずき、い んげんまめ、えん どうまめ、そらま めを除く)	マシクイ	1000～1500倍		収穫21日前まで			
	アブラムシ類	1000～2000倍					
	マシクイ	1000～1500倍					
未成熟そらまめ	シロイモシマダラムシ、 ダースヤクマハエ、カメシ類 マヒメヤムシ	1000倍		収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類	1000～2000倍					
	マシクイ	1000～1500倍					
豆類 (未成熟、ただし、 えだまめ、さやい んげん、未成熟そ らまめを除く)	シロイモシマダラムシ、 ダースヤクマハエ、カメシ類 マヒメヤムシ	1000倍		収穫 21 日前まで	4回以内	4回以内	
	アブラムシ類	1000～2000倍					
	マシクイ	1000～1500倍					
えだまめ	シロイモシマダラムシ、 ダースヤクマハエ、カメシ類 ウコンノメイガ、マヒメヤムシ	1000倍		収穫 21 日前まで	4回以内	4回以内	
	アブラムシ類	1000～2000倍					
	マシクイ	1000～1500倍					
いんげんまめ さやいんげん	シロイモシマダラムシ、 ダースヤクマハエ、カメシ類 マヒメヤムシ、インゲンテントウ	1000倍	1000～2000倍	1000～1500倍			
	アブラムシ類	1000～2000倍					
	マシクイ	1000～1500倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	MEP を含む 農薬の総 使用回数		
あずき	シロイチモンズマダラメイガ [*] 、タノイ [*] サヤクマハ [*] エ カメシカ類、マヒメサヤムシカ [*]	1000倍	100～300 L/10a	収穫21日前まで	4回以内	散布	4回以内		
	アブラムシ類	250倍	25L/10a						
	マシクカ [*]	1000～2000倍	100～300 L/10a						
そらまめ	アブラムシ類	1000～1500倍	100～300 L/10a	収穫3日前まで	3回以内			3回以内	
茶	コカモンハマキ チャノボサ [*]	700～1000倍	200～400 L/10a	摘採21日前まで	1回			1回	
とうもろこし	アリノメイガ [*] カメシカ類	1000倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	4回以内			4回以内	
ばれいしょ	アブラムシ類	250倍	25L/10a	収穫3日前まで	6回以内			6回以内	
	アブラムシ類、テントウムシダマシ類	1000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	3回以内			3回以内	
こんにゃく	アブラムシ類			収穫7日前まで	5回以内			5回以内	
かんしょ	イモカ [*] 、アブラムシ類、ヨモモンカメノコハムシ								
たらのき	センナミキリ幼虫、ヒメシロコブゾウムシ	100倍	150～300 L/10a	3～5月株養成期		樹幹散布			
モロヘイヤ	マメコガネ、アザミウマ類 アブラムシ類、カメシカ類	1000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内		
せり	アブラムシ類	2000倍		親株養成期 但し収穫4～5日前 まで					
樹木類	アメリカシロヒトリ	500～1000倍	200～700 L/10a	—	6回以内		6回以内		
	フタバハナゾウムシ アブラムシ類、クサハナハムシ類	1000倍							
		オオハシセンチュウ	500倍	—	移植前	1回	30分間 根部浸漬		
まめ科牧草	ヨコハナハムシ類、アブラムシ類、ウナハムシ類	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内		
いね科牧草	ウナハムシ、ゾウムシ類								
ばら	アブラムシ類	1000倍	100～300 L/10a	—	6回以内			6回以内	
	フタバハナゾウムシ	1000倍							
きく	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300 L/10a	—	6回以内			6回以内	
	フタバハナゾウムシ、カメシカ類、ヨウムシ類								
つつじ類	クサハナハムシ類、ハマキムシ類	1000倍	200～700 L/10a	発生初期	6回以内			6回以内	
カーネーション	アザミウマ類、クロウリハムシ		100～300 L/10a						
芝	コガネムシ類幼虫		3 L/m ²	0.3～2 L/m ²	発生初期			6回以内	6回以内
	シバツバサ スズキキリ								
			シバオサゾウムシ	3 L/m ²	幼虫発生期				
宿根かすみそう	ハメグサリハエ類		100～300 L/10a	100～300 L/10a	—	6回以内	6回以内		
アスター	ウリハムシ								
ソラカゴ	カメシカ類								
スターチス	コガネムシ類								
シネラリア	シクハムシ類								
斑入りアマトコロ	コウモリカ [*]								
ききょう	ヨウムシ								

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	MEP を含む 農薬の総 使用回数
さとうきび	カンショコハ [®] ネカ [®] カメシ、メイチュウ類 カンショワタア [®] ラムシ、セスジ [®] ツチイコ [®]	1000倍	100～300 L/10a	収穫45日前まで	4回以内	散布	4回以内
	カンショコハ [®] ネカ [®] カメシ セスジ [®] ツジ [®] イコ [®]	25倍	6L/10a			無人ヘリコプターによる散布	
げっきつ	ミカンキジ [®] ラムシ	1000倍	200～700 L/10a	—	6回以内	散布	6回以内
らっきょう	アザ [®] ミウマ類		100～300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内		2回以内
花き類・ 観葉植物	アオムシ、ハ [®] ック類 ハマキムシ類、アザ [®] ミウマ類	1000倍	100～300 L/10a	—	6回以内	散布	6回以内
せんりょう	アザ [®] ミウマ類、カメムシ類						
こでまり	カイ [®] ラムシ類						
しきみ	クスア [®] アキゾ [®] ウムシ						
にしきぎ	ケムシ類						
しゃりんばい だいおうしょう	シンクイムシ類						
さかき	ハマキムシ類						
さんごじゅ	ワタノメ [®] イコ [®]						
しちとうい	イネ [®] コカメムシ		60～150 L/10a	発生初期	2回以内	2回以内	
たばこ	ヨトウムシ		25～180 L/10a	収穫20日前まで	1回	1回	

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	本剤の 使用回数	使用方法	MEP を含む 農薬の総 使用回数
水田作物、畑作物 (休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、 セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が 優占している休耕田	カメシ類	1000倍	60～150 L/10a	4回以内	散布	4回以内