

多発 ヤンバルトサカヤステ



ヤステの
駆除には

不快害虫用殺虫剤

ヤステノン

粉 剤 3kg入


[成分] スミチオン・NAC混合剤

[適用害虫] ヤステ・ワラジムシ・ダンゴムシ・ムカデ・ハサミムシ・クロアリ

スミチオン・NAC混合剤なので、駆除効果が優れています。
しかも、DL粉なので飛散が少なく、散布作業中の安全性が高く撒きやすい。

ヤステの害


- 恐怖や不快感を与えます。
多発時には一夜に6,000個体余(約バケツ半分)の成体が屋敷内を這い回り家屋内にも侵入します。この状態が約1~2週間続き、人間に与える恐怖や不快感は想像以上のものであります。
ヤステ除去のための夜間作業は、睡眠不足を招き、健康上もよくありません。
- 多発時には、車両をスリップさせることもあります。
- ヤステ臭の中には、青酸ガスを含み、ヤステの駆除作業を行なった後に、まれに下痢症状を訴えることがあります。



防除・駆除法

- ヤステが住めない、環境整備に重点を置きます。
 - 湿潤な低地であれば排水溝を作り、水はけをよくします。
 - 除草、樹木の剪定を行い、日当りをよくします。
 - 落葉や廃材を堆積させないようにします。
- 殺虫剤を使用する方法
 - 発生場所にヤステノン(スミチオン・NAC混合剤)粉剤を1㎡当り30~40gほど散布します。
 - 家屋への侵入を防ぐには、家屋の土台周辺にベルト状にヤステノン粉剤を散布します。
 - 意図的に、腐葉層、古畳などを堆積し、誘引集合した所をヤステノンやサンケイフライサン(ジクロボス)で殺虫処理します。
 - 多発時には、サンケイフライサン、または混合乳剤を直接噴霧します。
 - 駆除作業は夜間に行くと効果的です。

ヤステの一生と防除歴 (県公害衛生研究所資料)



本 社
製造工場

琉球産経株式会社

沖縄県豊見城村字高安586番地
電話098-850-7791(代)